

FORT DODGE**FORT DODGE
ANIMAL HEALTH**

Revision 4
 Operator hal
 Date 02Jul08
 Product ID# 186171
 Resource # L18617
 Product Name Suvaxyn PCV2
 Type/Size Label / 100mL

FDAH Template . . .118
 Template
 Dimensions 2-1/2" x 5-1/2"
 File Path \1\PF\186171\
 186171
 PDF 02Jul08 hal
 Rev Level I

PMS 287**WYETH RED****PMS 107****Pantone Green****VARNISH****MASTER**

ALL ELECTRONIC ARTWORK IS THE PROPERTY OF, AND MUST BE RETURNED TO FORT DODGE ANIMAL HEALTH.

15186179

100 mL



50/100 Doses/Dosis

Porcine Circovirus Vaccine Type 1-Type 2 Chimera

Killed Virus

Vacuna contra el Circovirus Porcino Tipo 1-Tipo 2 Quimera

Virus Inactivado

**Suvaxyn® PCV2**For Use in Swine
For Veterinary Use Only

For the vaccination of healthy pigs 3 weeks of age or older as an aid in the prevention of viremia and as an aid in the control of lymphoid depletion caused by Porcine Circovirus Type 2. Efficacy was shown by challenging pigs 6 weeks following vaccination with a single 2 mL dose. Efficacy for the two 1 mL dose regimen was shown by challenging pigs 3 weeks following the second vaccination. Duration of immunity has been demonstrated with a single 2 mL dose by challenging pigs at four months post vaccination.

Fort Dodge Animal Health
A division of Wyeth
Fort Dodge, Iowa 50501 USA
U.S. Vet. License No. 112

Para Uso en Cerdos
Uso Veterinario

Para la vacunación de cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores como ayuda en la prevención de la viremia y como ayuda en el control de la depleción linfocítica causada por el Circovirus Porcino Tipo 2. Se demostró la eficacia por medio del desafío en cerdos a las 6 semanas después de la vacunación con una sola dosis de 2 mL. Se demostró la eficacia del régimen de dos dosis de 1 mL por medio del desafío en cerdos a las 3 semanas después de la segunda vacunación. La duración de la inmunidad con una sola dosis de 2 mL, ha sido demostrada por desafío en cerdos cuatro meses después de la vacunación.

Fort Dodge Animal Health
Una división de Wyeth
Fort Dodge, Iowa 50501 EE.UU.
Licencia Vet. de EE.UU. N° 112

DISIS: Inyectar 2 mL, asépticamente, por vía intramuscular en cerdos de 3 semanas de edad o mayores; también puede administrarse como una dosis de 1 mL a las 3 semanas de edad seguida por una segunda dosis de 1 mL 3 semanas después.

PRECAUCIÓN: Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C (35° y 45°F). EVITAR LA CONGELACIÓN. AGITAR BIEN ANTES DE USAR. Utilizar todo el contenido una vez abierto. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Raramente pueden manifestarse reacciones alérgicas. El amido es la epinefrina.

Contiene gentamicina y tiorosol como agentes conservantes.

Patentes de EE.UU. N° 6,165,995; 6,328,965; 6,703,023; 7,276,353; 7,279,166; 7,223,407 y patentes pendientes.

© 2008 Fort Dodge/Animal Health. Reservados Todos los Derechos.

DOSE: Aseptically inject 2 mL intramuscularly into pigs 3 weeks of age or older or may be administered as a 1 mL dose at 3 weeks of age followed by a second 1 mL dose 3 weeks later.
CAUTION: Store in the dark at 2° to 7°C (35° to 45°F). AVOID FREEZING. SHAKE WELL BEFORE USING. Use entire contents when first opened. Do not vacante with 21 days before slaughter. Allergic reactions, although rare, may occur. The antide is epinephrine.
 Contains gentamicin and thiorosal as preservatives.
 U.S. Patent Nos. 6,165,995; 6,328,965; 6,703,023; 7,276,353; 7,279,166; 7,223,407 and patents pending.
 © 2008 Fort Dodge Animal Health. All Rights Reserved.



7 26287 98617 1

186171



01848

Serial No.:
N° de Lote:
Exp. Date:
Fecha de
Vencimiento: